

Fiche d'information à destination des patientes


Annexectomie par laparotomie

Votre médecin vous a proposé une intervention nommée annexectomie par laparotomie. La présente feuille a pour but de renforcer les informations qui vous ont été apportées oralement par le médecin afin de vous expliquer les principes, les avantages et les inconvénients potentiels de l'intervention qu'il vous a conseillée.

➤ Qu'est-ce qu'une annexectomie ?

L'annexectomie consiste en l'ablation de l'annexe comprenant l'ovaire et sa trompe. Celle-ci peut être uni ou bilatérale.

Cette intervention permet de traiter ou de prévenir certaines pathologies de l'ovaire et de la trompe.



➤ Comment se passe l'opération ?

L'intervention se réalise sous anesthésie générale.

L'ouverture du ventre peut être horizontale ou verticale, selon la taille de l'annexe. Des biopsies abdominales peuvent être réalisées dans le même temps.

La durée de l'intervention est généralement d'1 à 1h30.

➤ Y a-t-il des inconvénients ?

Il s'agit d'une intervention de pratique courante. Il existe des risques peu fréquents :

- Un saignement peropératoire pouvant parfois nécessiter une transfusion
- Une infection du site opératoire
- Une plaie d'organe (vessie, uretère, intestin) qui nécessitera une réparation
- Des troubles de la cicatrisation au niveau de la paroi abdominale.

➤ En pratique :

- *Avant l'opération :*
- Une consultation pré-anesthésique est réalisée systématiquement
- Vous serez hospitalisée le matin même de l'intervention. L'intervention aura lieu en hospitalisation conventionnelle selon le geste réalisé.

- Au cours de l'opération :
 - Un examen gynécologique peut être réalisé, si besoin, sous anesthésie avant l'intervention.
 - Il peut être nécessaire, parfois, de vider la vessie par un sondage évacuateur.
- *Après l'opération :*
 - Vous serez surveillée en salle de réveil avant de retourner dans votre chambre
 - Le temps d'hospitalisation est variable (24 à 72h)
 - Il est conseillé d'éviter les bains le temps de la cicatrisation
 - Il peut vous être conseillé par votre chirurgien le port d'une ceinture abdominale de contention durant 1 mois
 - En cas de douleurs, de saignements, de fièvre $\geq 38.5^\circ$, de vomissements ou de toute autre anomalie, contactez le service.

Numéros utiles

Unité de chirurgie ambulatoire	02.97.06.93.84
Secrétariat d'hospitalisation de chirurgie	02.97.06.98.16
Urgences gynécologiques	
➤ 9h-17h	02.97.06.97.97
➤ La nuit, appeler le standard au 02.97.06.90.90 et demandez les urgences gynécologiques.	